

**DOMANDE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO NEL PROFILO DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE PEDIATRICO (CAT.D) -
PROVA PRATICA - BUSTA 1**

-
- 1) Fototerapia neonatale. Il candidato indichi la sequenza corretta:
- 1-Verificare le impostazioni e la corretta intensità della luce.
 - 2-Eseguire il lavaggio delle mani.
 - 3-Posizionare il neonato e la lampada da UVB per fototerapia a 15-20 cm.
 - 4-Cambiare frequentemente il pannolino spegnendo la lampada.
 - 5-Monitorare la temperatura del neonato ogni ora.
 - 6-Spogliare il neonato.
 - 7-Monitorare il livello di bilirubina.
 - 8-Sospendere dietro prescrizione medica.
 - 9-Proteggere gli occhi del neonato.
 - 10-Mobilizzare il neonato ogni paio d'ore controllando i parametri.
 - 11-Preparare il materiale e le apparecchiature.
- A 11-2-3-1-6-9-10-5-4-7-8
B 6-5-3-11-1-7-10-4-8-2-9
C 11-3-5-6-10-4-8-2-9-7-1
-
- 2) Posizionare un catetere Folley con un solo operatore. Il candidato indichi la sequenza corretta:
- 1-Eseguire il lavaggio delle mani e organizzare una superficie per il campo sterile.
 - 2-Indossare i guanti sterili, lubrificare il catetere e visualizzare il meato uretrale con l'aiuto della mano.
 - 3-Predisporre il materiale necessario, presentarsi, identificare attivamente e informare il paziente.
 - 4-Indossare i guanti non sterili disinfettare il meato uretrale e i genitali esterni.
 - 5-Iniettare mediante siringa circa 7/10 ml di soluzione fisiologica nella seconda via del catetere per fissarlo.
 - 6-Fissare al letto il sacchetto raccoglitore, precedentemente raccordato al catetere, a un livello inferiore rispetto all'altezza della vescica del paziente.
 - 7-Inserire con la mano non contaminata il catetere nel meato, procedere delicatamente fino a quando non comincia a defluire l'urina.
 - 8-Esercitare una delicata trazione sul catetere e fissarlo.
- A 3-1-2-4-7-8-5-6
B 3-1-4-2-5-7-6-8
C 3-1-4-2-7-5-8-6
-
- 3) Il candidato indichi la sequenza corretta per effettuare il trattamento di una ferita lacero-contusa all'avambraccio dx in Pronto Soccorso:
- 1-Indossare guanti e procedere al lavaggio della ferita.
 - 2-Eseguire toelettatura della ferita (collaborare con il Medico per eventuale sutura della ferita).
 - 3-Previo prescrizione medica, eseguire profilassi antitetanica.
 - 4-Indossare guanti sterili ed eseguire antisepsi della ferita.
 - 5-Accogliere, tranquillizzare il paziente e farlo accomodare sul lettino visita.
 - 6-Ispezionare visivamente la ferita, rimuovere guanti, lavarsi le mani.
 - 7-Predisporre il materiale per un'accurata detersione o lavaggio della stessa.
 - 8-Lavarsi le mani ed indossare guanti e liberare l'arto ferito dagli indumenti ancora presenti.
 - 9-Confezionare medicazione e bendaggio finale di protezione della ferita.
 - 10-Rimuovere i guanti, lavarsi le mani e predisporre il materiale per antisepsi della ferita.
- A 5-7-6-1-8-10-2-9-3-4
B 5-8-6-7-1-10-4-2-9-3
C 5-6-8-10-1-7-3-4-2-9
-
- 4) Ordinare correttamente le azioni da compiere per posizionare il SNG in un adolescente:
- 1-Inserire il sondino attraverso la narice verso il fondo della gola e fare deglutire il paziente o fargli bere alcuni sorsi d'acqua.
 - 2-Disporre il paziente in posizione semiseduta con la testa sollevata.
 - 3-Esaminare le narici e scegliere la più pervia.
 - 4-Lavare le mani e indossare i guanti.
 - 5-Fissare il sondino al naso con un cerotto anallergico.
 - 6-Lubrificare il sondino con lubrificante idrosolubile.
 - 7-Misurare approssimativamente la lunghezza del sondino naso-gastrico.
 - 8-Fare avanzare il sondino fino a raggiungimento del punto prestabilito.
 - 9-Controllare il corretto posizionamento del sondino.

- A 5-3-6-1-7-4-8-2-9
- B 4-2-3-7-6-1-8-9-5
- C 3-1-5-8-6-7-9-2-4

-
- 5) Qual è la corretta misurazione della lunghezza del SNG:
- A Dall'apice del lobo auricolare al processo xifoideo
 - B Dalla punta del naso al processo xifoideo
 - C Dalla punta del naso all'apice del lobo auricolare e quella tra il lobo auricolare e l'estremità inferiore dello sterno
-
- 6) Quante gocce al minuto sono necessarie per infondere 500ml di NaCl in 2h se il fattore gocciolamento è di 15 gtt/ml?
- A 125
 - B 100
 - C 62
-
- 7) Devi somministrare 0,5 gr di Paracetamolo e hai a disposizione un flacone di sciroppo da 200 mg/10ml. Quanti ml somministri?
- A 12,5
 - B 5
 - C 25
-
- 8) Eseguire la seguente equivalenza: 7500mcg di farmaco a quanti mg equivalgono?
- A 75
 - B 7.5
 - C 750
-
- 9) Se un neonato è classificato come LGA vuol dire che ha:
- A Misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale
 - B Misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale
 - C Misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale
-
- 10) In caso di stravasamento durante somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali, immediatamente occorre:
- A Interrompere la somministrazione e rimuovere l'ago
 - B Interrompere la somministrazione e aspirare il più possibile il farmaco residuo dal catetere
 - C Rallentare la velocità e chiamare il medico
-
- 11) **DOMANDA DI RISERVA:** Ordinare correttamente le operazioni da compiere per praticare la rimozione dei punti di sutura di una ferita chirurgica:
- 1-Disinfettare la ferita.
 - 2-Tirare ed asportare il punto di sutura con la pinza.
 - 3-Prendere la pinza e le forbici.
 - 4-Sollevare il nodo del punto di sutura con la pinza.
 - 5-Lavare le mani e indossare i guanti.
 - 6-Togliere la medicazione.
 - 7-Predisporre il materiale occorrente.
 - 8-Tagliare il filo di sutura di fianco al nodo.
 - 9-Disinfettare la ferita e applicare un cerotto medicato.
- A 7-5-1-6-3-2-8-4-9
 - B 7-5-6-1-3-4-8-2-9
 - C 1-8-7-5-2-4-6-3-9
-
- 12) **DOMANDA DI RISERVA:** Francesco deve sottoporsi ad una cura antibiotica con Amikacina 15 mg/Kg/die, diviso in due somministrazioni. Francesco pesa 10 Kg. Quanti mg dovrai utilizzare per ogni singola somministrazione?
- A 150
 - B 7,5
 - C 75