

**DOMANDE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO NEL PROFILO DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE PEDIATRICO (CAT.D) -
PROVA PRATICA - BUSTA 2**

-
- 1) Inserimento catetere venoso periferico. Il candidato indichi la sequenza corretta:
- 1-Tendere la cute e pungere la cute.
 - 2-Applicare la crema anestetica.
 - 3-Preparare il materiale.
 - 4-Eseguire il lavaggio delle mani.
 - 5-Informare il paziente e i genitori sulla procedura da eseguire.
 - 6-Applicare il laccio emostatico.
 - 7-Detergere la zona prescelta per l'inserzione del CVC.
 - 8-Diminuire l'angolo del presidio rispetto alla cute e procedere al suo interno per mezzo cm.
 - 9-Rimuovere il laccio.
 - 10-Indossare i guanti monouso.
 - 11-Retrarre l'ago e lasciare in sede la cannula.
 - 12-Identificare la zona idonea al posizionamento.
- A 5 -12-2-3-4-10-6-7-1-8-9-11
B 10-1-5-9-7-12-8-6-4-3-11-2
C 9-1-5-2-11-7-10-6-8-12-4-3
-
- 2) Posizionamento drenaggio toracico in neonato. Il candidato indichi la sequenza corretta:
- 1-Applicare medicazione sterile.
 - 2-Detergere l'emitorace interessato e posizionare il telino sterile.
 - 3-Posizionare il neonato.
 - 4-Smaltire il materiale.
 - 5-Collaborare con il medico durante infiltrazione anestetico locale e durante inserzione del tubo di drenaggio.
 - 6-Collegare il drenaggio al sistema di aspirazione.
 - 7-Disporre il materiale necessario per esecuzione procedura.
 - 8-Identificare il punto di inserzione.
- A 2-7-4-3-5-1-6-8
B 8-2-7-3-4-6-1-5
C 7-3-2-8-5-6-1-4
-
- 3) Esecuzione di una tricotomia preoperatoria. Il candidato indichi la sequenza corretta:
- 1-Ripulire l'area tricotomizzata con soluzione detergente al fine di eliminare eventuali residui di pelo.
 - 2-Fare indossare al paziente un camice pulito.
 - 3-Procedere alla rasatura.
 - 4-Verificare, nella documentazione clinica, quale area deve essere depilata in relazione al tipo di intervento chirurgico.
 - 5-Predisporre il materiale occorrente.
 - 6-Adottare le misure volte a garantire la privacy.
 - 7-Sciacquare accuratamente ed asciugare la cute.
 - 8-Lavarsi le mani ed indossare i guanti monouso.
 - 9-Detergere la zona interessata alla depilazione.
 - 10-Disinfettare l'area della cute tricotomizzata.
- A 6-8-5-4-3-1-7-10-9-2
B 4-6 8-5-3-1-7-10-2-9
C 4-5-6-8-9-3-1-7-10-2
-
- 4) Ordinare correttamente le operazioni da compiere per praticare un enteroclisma:
- 1-Rimuovere la sonda dal retto.
 - 2-Preparare tutto il materiale occorrente.
 - 3-Agganciare l'apparecchio ad un'asta.
 - 4-Disporre il paziente in decubito laterale sinistro.
 - 5-Spiegare la procedura e Garantire la privacy al paziente.
 - 6-Raccordare la sonda rettale al tubo e lubrificarla.
 - 7-Indossare i guanti e riempire il contenitore con la soluzione scelta.
 - 8-Inserire la sonda nel retto e lasciare defluire la soluzione.
 - 9-Eliminare l'aria dal tubo.
- A 2-5-7-9-3-4-6-8-1
B 9-5-1-6-8-7-3-2-4
C 1-5-9-3-6-7-2-4-8

-
- 5) In relazione alle linee guida del CDC, per le somministrazioni s.c., la disinfezione preliminare della cute deve avere le seguenti caratteristiche: Cute pulita - Uso di antisettico - Uso di soluzioni a base alcolica - Strofinamento della cute per 30 sec. Quale sequenza di Vero (V) / Falso (F) tra le seguenti è corretta?
- A V-V-F-V
 - B V-V- F-F
 - C F-V-F-F
-
- 6) In caso di pneumotorace il catetere inserito in cavità pleurica deve:
- A Restare clampato in prima giornata
 - B Essere collegato ad una valvola ad acqua
 - C Essere collegato ad un sacchetto sterile a caduta
-
- 7) Bisogna somministrare 100 mg di Fenobarbitale per via intramuscolare per il trattamento di una crisi convulsiva. Hai a disposizione confezioni da 200 mg/5ml. Quanti ml somministri?
- A 3.5
 - B 2.5
 - C 5
-
- 8) Bisogna somministrare a Marco di 6 anni che pesa 20 kg, 20 mg/Kg di antibiotico. Quanti ml bisogna somministrare se si hanno a disposizione fiale da 1 g/4 ml?
- A 2
 - B 1.6
 - C 3.2
-
- 9) A quanti ml corrispondono 2,5 lt di sol. fis.?
- A 2500
 - B 25
 - C 250
-
- 10) Se un neonato è classificato alla nascita come AGA, vuol dire che ha:
- A Misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale
 - B Misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale
 - C Misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale
-
- 11) **DOMANDA DI RISERVA:** Indicare la sequenza corretta nella somministrazione della terapia per via rettale:
- 1-Sistemare il bambino in posizione laterale sinistra, con la gamba destra flessa.
 - 2-Smaltire il materiale utilizzato.
 - 3-Eseguire il lavaggio delle mani e indossare i guanti.
 - 4-Spiegare la procedura al bambino e ai genitori.
 - 5-Lubrificare la supposta con gel idrosolubile.
 - 6-Comprimere delicatamente le natiche fino alla diminuzione del riflesso di espulsione del farmaco.
 - 7-Eseguire il lavaggio delle mani.
 - 8-Inserire delicatamente la supposta.
- A 4-5-3-8-6-1-7-2
 - B 4-3-1-5-8-6-2-7
 - C 1-3-4-5-8-6-7-2
-
- 12) **DOMANDA DI RISERVA:** Bisogna somministrare 50 mg/kg al giorno di cefaloridina ad un bimbo che pesa 12 kg, divisi in tre somministrazioni giornaliere. Qual è il dosaggio totale giornaliero in mg di farmaco da somministrare?
- A 200
 - B 600
 - C 120