

**DOMANDE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO NEL PROFILO DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE PEDIATRICO (CAT.D) -
PROVA PRATICA - BUSTA 1**

-
- 1) **Se un neonato è classificato SGA significa che:**
- A Le sue misure antropometriche e il suo peso sono superiori rispetto alla media per l'età gestazionale
 - B Le sue misure antropometriche e il suo peso sono appropriati per l'età gestazionale
 - C Le sue misure antropometriche e il suo peso sono inferiori rispetto alla media per l'età gestazionale
-
- 2) **Terapia intramuscolo nel lattante. Il candidato indichi la sequenza corretta:**
- 1-Smaltimento dei rifiuti.
 - 2-Controllo prescrizione medica, preparazione e corretta diluizione del farmaco.
 - 3-Scelta della sede (nel lattante è indicato il vasto femorale, laterale).
 - 4-Indossare i guanti monouso.
 - 5-Preparazione del materiale.
 - 6-Prendere tra pollice ed indice la parte interessata, cercando di afferrare parte del muscolo.
 - 7-Eseguire la puntura, aspirando leggermente prima di inoculare il farmaco.
 - 8-Informazione alla mamma o genitore presente; se il bambino si attacca al seno, far attaccare il lattante al seno alcuni minuti prima di procedere all'esecuzione della puntura e spiegare alla mamma le motivazioni di questa scelta altrimenti trovare altre soluzioni compensatorie.
 - 9-Tamponare dopo aver terminato la somministrazione.
 - 10-Corretta igiene delle mani.
 - 11- Disinfezione accurata della zona scelta per somministrazione del farmaco.
- A 7-9-3-5-11-6-10-1-8-4-2
 - B 10-5-2-3-8-4-11-6-7-9-1
 - C 5-11-4-2-8-6-3-7-9-10-1
-
- 3) **Se un neonato è classificato alla nascita come AGA, vuol dire che ha:**
- A Misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale
 - B Misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale
 - C Misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale
-
- 4) **Nel caso si utilizzi un deflussore che eroga 10 gocce per 1 millilitro, per regolare la velocità di infusione allo scopo di somministrare un litro di soluzione in circa otto ore, occorre regolare il deflussore in modo che si somministrino:**
- A 40 gocce al minuto.
 - B 15 gocce al minuto.
 - C 20 gocce al minuto.
-
- 5) **Ordinare le operazioni da compiere per praticare un prelievo di sangue mediante sistema vacutainer:**
- 1-Disinfettare il punto prescelto per il prelievo.
 - 2-Lavare le mani.
 - 3-Inserire la provetta nella camicia e attendere il riempimento.
 - 4-Avvitare l'ago nella camicia.
 - 5-Procedere alla puntura nella vena.
 - 6-Togliere l'ago dalla vena e tamponare il punto di iniezione.
 - 7-Posizionare il laccio emostatico al braccio del paziente. 8-Sfilare la provetta dalla camicia.
 - 9-Predisporre il materiale occorrente.
 - 10-Togliere il laccio emostatico.
- A 5-8-1-3-2-7-4-6-10-9
 - B 3-7-10-1-5-8-6-2-4-9
 - C 2-9-4-7-1-5-3-10-8-6
-
- 6) **Dividendo il gluteo in quattro quadranti, se si pratica una iniezione intramuscolare nel quadrante superiore esterno, è stata scelta la sede:**
- A Deltoide
 - B Dorsogluteare
 - C Ventrogluteare
-
- 7) **Quante compresse da 500mg si devono somministrare per ottenere 250 mg di dosaggio?**

- A 2 compresse.
- B Una compressa e un quarto
- C Mezza compressa.

8) Con la somministrazione di 500 cc di glucosata al 5% viene garantito l'apporto di:

- A 300 kcal
- B 100 Kcal
- C 500 kcal

9) Inserimento catetere venoso periferico. Il candidato indichi la sequenza corretta:

- 1-Tendere la cute e pungere la cute.
- 2-Applicare la crema anestetica.
- 3-Preparare il materiale.
- 4-Eseguire il lavaggio delle mani.
- 5-Informare il paziente e i genitori sulla procedura da eseguire.
- 6-Applicare il laccio emostatico.
- 7-Detergere la zona prescelta per l'inserzione del CVC.
- 8-Diminuire l'angolo del presidio rispetto alla cute e procedere al suo interno per mezzo cm.
- 9-Rimuovere il laccio.
- 10-Indossare i guanti monouso.
- 11-Retrarre l'ago e lasciare in sede la cannula.
- 12-Identificare la zona idonea al posizionamento.

- A 9-1-5-2-11-7-10-6-8-12-4-3
- B 5 -12-2-3-4-10-6-7-1-8-9-11
- C 10-1-5-9-7-12-8-6-4-3-11-2

10) In caso di pneumotorace il catetere inserito in cavità pleurica deve:

- A Essere collegato ad una valvola ad acqua
- B Restare clampato in prima giornata
- C Essere collegato ad un sacchetto sterile a caduta

11) **DOMANDA DI RISERVA:** Indicare la sequenza corretta per la somministrazione della terapia aerosolica:

- 1-Iniziare la terapia.
- 2-Eseguire il lavaggio delle mani.
- 3-Scegliere i dispositivi più idonei e preparare il materiale.
- 4-Assemblare l'apparecchio.
- 5-Preparare il farmaco.
- 6-Indossare i DPI.
- 7-Rilevare i parametri vitali.
- 8-Effettuare l'igienizzazione del materiale.
- 9-Applicare il presidio al bambino.

- A 2-3-6-7-4-5-8-9-1
- B 2-3-6-4-5-9-1-7-8
- C 3-2-4-5-7-8-1-9-6

12) **DOMANDA DI RISERVA:** La malattia emolitica neonatale si manifesta nelle seguenti condizioni:

- A Madre Rh negativo e feto Rh positivo.
- B Madre Rh positivo e padre Rh positivo.
- C Madre Rh positivo, padre Rh negativo e feto Rh negativo.