

**DOMANDE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER  
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO  
INDETERMINATO NEL PROFILO DI COLLABORATORE  
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE PEDIATRICO (CAT.D) -  
PROVA PRATICA - BUSTA 2**

- 
- 1) Un neonato di 3 kg con infezione delle vie urinarie deve fare Gentalin i.m. 9 mg x2 /die. Il preparato è di 80 mg/ml .Quanti ml devono essere somministrati?
- A 0.2 ml  
B 1ml  
C 0.5 ml
- 
- 2) Ordinare correttamente le operazioni da compiere per somministrare ossigeno con la maschera:
- 1-Posizionare la maschera sul viso del paziente.
  - 2-Inserire il misuratore di flusso nella presa a muro.
  - 3-Accendere l'umidificatore.
  - 4-Posizionare il paziente in posizione di fowler.
  - 5-Spiegare la procedura al paziente e genitore e lavarsi le mani.
  - 6-Collegare il tubo dell'ossigeno al misuratore di flusso.
  - 7-Aprire l'ossigeno.
  - 8-Sistemare il nastro elastico dietro la testa.
  - 9-Controllare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e osservare la risposta del paziente.
- A 4-6-2-3-5-9-8-7-1  
B 2-6-3-7-1-5-9-8-4  
C 5-4-2-6-3-7-1-8-9
- 
- 3) Eseguire la seguente equivalenza: 2300mcg di farmaco corrispondono a mg?
- A 0.23 mg  
B 23 mg  
C 2.3 mg
- 
- 4) Bisogna somministrare a Marco di 6 anni che pesa 20 kg, 20 mg/Kg di antibiotico. Quanti ml bisogna somministrare se si hanno a disposizione fiale da 1 g/4 ml?
- A 2  
B 3.2  
C 1.6
- 
- 5) Esecuzione di una tricotomia preoperatoria. Il candidato indichi la sequenza corretta:
- 1-Ripulire l'area tricotomizzata con soluzione detergente al fine di eliminare eventuali residui di pelo.
  - 2-Fare indossare al paziente un camice pulito.
  - 3-Procedere alla rasatura.
  - 4-Verificare, nella documentazione clinica, quale area deve essere depilata in relazione al tipo di intervento chirurgico.
  - 5-Predisporre il materiale occorrente.
  - 6-Adottare le misure volte a garantire la privacy.
  - 7-Sciogliere accuratamente ed asciugare la cute.
  - 8-Lavarsi le mani ed indossare i guanti monouso.
  - 9-Detergere la zona interessata alla depilazione.
  - 10-Disinfettare l'area della cute tricotomizzata.
- A 4-5-6-8-9-3-1-7-10-2  
B 6-8-5-4-3-1-7-10-9-2  
C 4-6 8-5-3-1-7-10-2-9
- 
- 6) Procedura medicazione cvc, indicare la corretta sequenza:

- A** eseguire correttamente l'igiene delle mani, rimuovere la medicazione, eseguire ispezione visiva, rimuovere guanti, eseguire igiene mani ed indossare i guanti sterili, eseguire palpazione del sito di inserzione, eseguire eventuale detersione del sito con sol.fisiologica a caduta e asciugare con garze sterili, utilizzare clorexidina alcolica al 2% o ipoclorito di sodio 0,05% procedendo con movimenti circolari dal centro verso la periferia senza ripassare e lasciare asciugare per circa 2 minuti, applicare nuova medicazione
- B** preparare il materiale utile sul piano di appoggio, rimuovere la medicazione, eseguire ispezione visiva, eseguire igiene mani ed indossare i guanti sterili, eseguire palpazione del sito di inserzione, sostituire i guanti, igiene mani, sostituire i guanti, igiene mani, , utilizzare clorexidina alcolica al 2% o ipoclorito di sodio 0,05% procedendo con movimenti circolari dal centro verso la periferia senza ripassare e lasciare asciugare per circa 2 minuti, eseguire eventuale detersione del sito con sol.fisiologica a caduta, applicare una nuova medicazione
- C** eseguire correttamente l'igiene delle mani, preparare il materiale utile sul piano di appoggio, eseguire il lavaggio mani e indossare i guanti, rimuovere la medicazione, eseguire ispezione visiva, rimuovere guanti, eseguire igiene mani ed indossare i guanti sterili, eseguire palpazione del sito di inserzione, sostituire i guanti, igiene mani, sostituire i guanti, igiene mani, eseguire eventuale detersione del sito con sol.fisiologica a caduta e asciugare con garze sterili, utilizzare clorexidina alcolica al 2% o ipoclorito di sodio 0,05% procedendo con movimenti circolari dal centro verso la periferia senza ripassare e lasciare asciugare per circa 2 minuti, applicare una nuova medicazione

---

7) **Federico di 10 anni presenta un'otite ed il pediatra ha prescritto 100 mg di antibiotico in sciroppo ogni 8 ore. La formulazione disponibile è da 62.5 mg/5 ml. Quanti ml di sciroppo deve assumere Federico?**

- A** 8 ml  
**B** 4 ml  
**C** 5 ml

---

8) **Bisogna somministrare 100 mg di Fenobarbitale per via intramuscolare per il trattamento di una crisi convulsiva. Hai a disposizione confezioni da 200 mg/5ml. Quanti ml somministri?**

- A** 3.5  
**B** 2.5  
**C** 5

---

9) **Posizionamento drenaggio toracico in neonato. Il candidato indichi la sequenza corretta:**

- 1-Applicare medicazione sterile.
- 2-Detergere l'emitorace interessato e posizionare il telino sterile.
- 3-Posizionare il neonato.
- 4-Smaltire il materiale.
- 5-Collaborare con il medico durante infiltrazione anestetico locale e durante inserzione del tubo di drenaggio.
- 6-Collegare il drenaggio al sistema di aspirazione.
- 7-Disporre il materiale necessario per esecuzione procedura.
- 8-Identificare il punto di inserzione.

- A** 2-7-4-3-5-1-6-8  
**B** 8-2-7-3-4-6-1-5  
**C** 7-3-2-8-5-6-1-4

---

10) **Nel processo infermieristico la valutazione non è:**

- A** la fase in cui vengono decisi gli interventi  
**B** la fase che precede la raccolta dati  
**C** l'ultima fase del processo

---

11) **DOMANDA DI RISERVA: Esecuzione di una medicazione con idrocolloide. Il candidato indichi la sequenza corretta:**

- 1-Ispezionare giornalmente la medicazione per valutare la presenza di materiale di secrezione, lo spostamento della medicazione e il suo odore.
- 2-Fare assumere al paziente una posizione comoda che consenta la massima visione della ferita e scoprire solamente la zona interessata.
- 3-Documentare tutte le informazioni utili sulla cartella infermieristica.
- 4-Rimuovere ed eliminare i guanti utilizzati.
- 5-Applicare la medicazione idrocolloidale.
- 6-Spiegare al paziente che cosa si sta facendo e perché e come eventualmente può collaborare.
- 7-Detergere accuratamente la cute con soluzione fisiologica e sciacquare sempre bene la cute prima di applicare la medicazione.
- 8-Lavarsi le mani e osservare le indicazioni per il controllo delle infezioni.

- A** 6-2-8-5-4-7-3-1  
**B** 6-8-2-7-5-4-1-3  
**C** 6-8-2-5-7-1-4-3

- 12) **DOMANDA DI RISERVA:** Ordinare correttamente le operazioni da compiere per praticare un enteroclisma:
- 1-Rimuovere la sonda dal retto.
  - 2-Preparare tutto il materiale occorrente.
  - 3-Agganciare l'apparecchio ad un'asta.
  - 4-Disporre il paziente in decubito laterale sinistro.
  - 5-Spiegare la procedura e Garantire la privacy al paziente.
  - 6-Raccordare la sonda rettale al tubo e lubrificarla.
  - 7-Indossare i guanti e riempire il contenitore con la soluzione scelta.
  - 8-Inserire la sonda nel retto e lasciare defluire la soluzione.
  - 9-Eliminare l'aria dal tubo.
- A 9-5-1-6-8-7-3-2-4  
B 1-5-9-3-6-7-2-4-8  
C 2-5-7-9-3-4-6-8-1