

DOMANDE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI INFERMIERE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) E CONTESTUALE SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - PROVA SCRITTA - BUSTA 2

-
- 1) **La Legge 38 del 15 marzo 2010,rende obbligatorio:**
- A La rilevazione e il monitoraggio del dolore attraverso scale di misurazione anche non validate
 - B La rilevazione e la documentazione del dolore nella documentazione infermieristica
 - C L'utilizzo della ranitidina nella gestione del dolore
 - D La lotta alle cause del dolore attraverso la promozione della soddisfazione dell'utente
-
- 2) **Secondo quanto stabilito dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può nominare un proprio fiduciario. Tale Fiduciario:**
- A deve essere un familiare o un legale indicato dalla anche dalla famiglia
 - B deve essere una persona maggiorenne capace di intendere e di volere, nominata dal paziente che puo' revocarlo in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione
 - C deve essere una persona formata e competente in materia sanitaria,la cui nomina non può essere revocata se non per disposizione di un organo giuridico
 - D deve essere un soggetto maggiorenne, capace di svolgere il ruolo di Amministratore di sostegno
-
- 3) **Secondo quanto disposto dall'art. 19 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019, in relazione alla raccolta dati nel processo assistenziale, l'infermiere:**
- A Raccoglie interpreta e riferisce i dati forniti dal paziente, se questi è ritenuto in condizioni tali da pregiudicarne la capacità comunicativa
 - B Raccoglie i dati e li sottopone al dirigente, secondo quanto stabilito dal regolamento aziendale sulla privacy
 - C Raccoglie e utilizza tutti i dati, esclusivamente per finalità terapeutiche attinenti alla patologia dell'assistito
 - D Raccoglie, analizza e utilizza i dati in modo appropriato, limitandosi a ciò che è necessario all'assistenza infermieristica, nel rispetto dei diritti della persona e della normativa vigente
-
- 4) **Indicare l'affermazione corretta riguardo le via di somministrazione degli analgesici:**
- A Le vie transdermica, rettale o sottocutanea vengono utilizzate esclusivamente nel paziente pediatrico.
 - B In persone senza problemi di deglutizione/nausea la via di somministrazione da preferire è quella orale. Nel paziente chirurgico viene utilizzata la somministrazione EV nell'immediata fase post operatoria, per poi passare alla somministrazione orale quando tollerata.
 - C Per produrre analgesia, il farmaco somministrato per via topica deve superare lo strato corneo ed entrare nella circolazione sistemica, mentre i farmaci somministrati per via transdermica producono effetti solamente nei tessuti sottostanti il punto di applicazione (analgesia periferica mirata)
 - D La modalità più efficace per la somministrazione di analgesici è l'iniezione intradermica
-
- 5) **A livello polmonare, la capacità funzionale residua CFR:**
- A Può aumentare in caso di BPCO e di ARDS
 - B Potrebbe non modificarsi in caso di patologia grave
 - C Può diminuire in caso di BPCO e aumentare in caso di ARDS
 - D Può aumentare in caso di BPCO e diminuire in caso di ARDS
-
- 6) **La somministrazione di ossigeno in un paziente con edema polmonare, nella fase iniziale del trattamento può avvenire con:**

- A maschera facciale con reservoir
 - B cannula orofaringea
 - C maschera facciale semplice
 - D sondino nasofaringeo
-

7) **L'infermiere che effettua l'esame obiettivo in un paziente con scompenso cardiocircolatorio può più frequentemente riscontrare :**

- A calo ponderale, cianosi, aerofagia, irritabilità
 - B edema del volto, sudorazione , disorientamento, globo vescicale
 - C aumento ponderale - Turgore giugulare- Edemi declivi- Epatomegalia
 - D dispnea, ittero, extrasistolia rantoli respiratori
-

8) **Fattori che influenzano la guarigione della ferita sono:**

- A Presenza di edema, l'utilizzo di farmaci corticosteroidi, l'effettuazione della manovra di Valsalva, l'età dell'assistito.
 - B Presenza di edema, l'utilizzo di farmaci antiemetici, l'effettuazione della manovra di Valsalva
 - C Presenza di emorragie, l'effettuazione della manovra di Heimlich, l'utilizzo di integratori a base di cranberry
 - D L'utilizzo di farmaci diuretici, l'età dell'assistito ed il rilassamento muscolare
-

9) **per mantenere l'asepsi , durante un intervento chirurgico:**

- A gli operatori devono eseguire il lavaggio chirurgico delle mani, indossare i guanti sterili e assicurarsi che il paziente sia stato adeguatamente preparato all'intervento chirurgico
 - B il chirurgo e l'infermiere strumentista devono eseguire il lavaggio chirurgico delle mani all'inizio e alla fine dell'intervento
 - C tutti i materiali a contatto con la ferita chirurgica e con il campo sterile devono essere sterili, i camici devono essere tenuti sterili dal torace fino all'altezza del campo sterile
 - D è sufficiente che al paziente sia stata eseguita una corretta preparazione igienica all'intervento
-

10) **In un contesto ospedaliero, la Legionella pneumophila si può trasmettere:**

- A Da persona a persona
 - B Attraverso la puntura di zanzara
 - C Attraverso i sistemi di condizionamento dell'aria, l'acqua potabile, le condotte idrauliche ed i presidi per la terapia respiratoria
 - D Esclusivamente per via alimentare
-

11) **L'educazione a livello domiciliare della persona a rischio ipercalcemia deve prevedere tra l'altro:**

- A L'informazione sull'importanza della frequente deambulazione e dell'assunzione di liquidi ricchi di sodio (se non controindicato da altre patologie in corso), il consumo di fibre per prevenire la stipsi e la possibilità di alterazioni dello stato mentale reversibili con la terapia.
 - B L'informazione sull'importanza della cessazione all'abitudine del fumo e dell'assunzione di cibi poveri di sodio oltre alla valutazione costante dell'INR.
 - C L'informazione sull'importanza della valutazione della glicemia prima e dopo i pasti e dell'assunzione di moderate quantità di alcool solo durante i pasti, suggerendo una dieta ricca di sodio.
 - D L'informazione sull'importanza del riposo e dell'assunzione di cibi ricchi di carboidrati complessi poveri di sodio (se non controindicato da altre patologie in corso).
-

12) **L'evento più frequente di danno iatrogeno al paziente ospedalizzato è:**

- A mancata prevenzione delle cadute
 - B insorgenza di lesioni da compressione
 - C errore nella somministrazione farmacologica
 - D infezione del sito chirurgico
-

13) **i farmaci LASA sono:**

- A farmaci antinfiammatori non steroidei
- B farmaci stupefacenti soggetti a registrazione del carico e scarico
- C farmaci la cui somministrazione deve avvenire sotto diretto controllo medico
- D farmaci che possono essere scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome nonché per il packaging

-
- 14) **Il Ministero della Salute ha redatto 19 Raccomandazioni per l'utilizzo in sicurezza dei farmaci, la prima riguarda le soluzioni concentrate di KCl, quali sono le modalità indicate da tale raccomandazione:**
- A la somministrazione di KCl deve essere sempre effettuata tramite CVC
 - B il KCl non può essere somministrato per via venosa, ma solo in soluzione per bocca
 - C conservazione in farmacia e non in corsia, prescrizione medica tracciabile e in formulazioni commerciali già diluite, la preparazione a concentrazione maggiore di quella commerciale deve essere effettuata dal farmacista. La somministrazione richiede la doppia presenza di sanitari
 - D le soluzioni contenenti KCl devono essere preparate e somministrate in presenza del medico
-
- 15) **Nell'assistenza infermieristica ad una persona nefropatica ospedalizzata per una frattura all'arto inferiore destro si deve tener presente che:**
- A Se è presente un accesso vascolare per l'emodialisi, esso può essere utilizzato per la terapia endovenosa in situazioni non di emergenza.
 - B L'accesso vascolare per l'emodialisi non deve mai presentare soffi o fremiti.
 - C È possibile utilizzare l'arto con l'accesso vascolare per l'emodialisi per la misurazione della pressione arteriosa solo se effettuata rapidamente.
 - D La persona è più a rischio di infezione, pertanto tutte le procedure devono essere effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione.
-
- 16) **La Triade di Virchow, causa del tromboembolismo profondo, comprende fenomeni quali:**
- A ipossia tissutale, stasi venosa, alterazione della percezione sensoriale
 - B edema, processi infiammatori della cute, lesione endoteliale vascolare
 - C stasi venosa, lesione della parete vasale, alterazione dei processi coagulativi
 - D alterazioni della cute, stasi venosa, fragilità capillare
-
- 17) **Segni e sintomi della persona con ostruzione parziale da corpo estraneo sono:**
- A Capacità di inspirare e espirare, tosse inefficace o assente e impossibilità di parlare
 - B Tosse efficace, segnale universale di soffocamento e polso aritmico
 - C Impossibilità di respirare, tosse efficace e scambi gassosi insufficienti
 - D Capacità di inspirare e espirare, tosse efficace e scambi gassosi sufficienti
-
- 18) **Qual'è la caratteristica di un CVC tunnellizzato:**
- A È un catetere centrale premedicato con antibiotico
 - B Si inserisce direttamente in vaso per un tratto non inferiore di 2 cm
 - C Decorre sottocute, raggiunge un vaso e vi si inserisce
 - D È un catetere periferico dotato di doppia guaina
-
- 19) **Non è un fattore di rischio per l'incontinenza urinaria:**
- A Diabete mellito
 - B Broncopneumopatia cronica ostruttiva
 - C Obesità
 - D Disturbi cognitivi (ad es. demenza)
-
- 20) **Quale struttura eroga i servizi socio/assistenziali:**
- A azienda ospedaliera universitaria
 - B distretto socio-sanitario
 - C presidio ospedaliero
 - D clinica privata convenzionata
-
- 21) **Il ricevente la trasfusione di sangue o di emocomponenti e/o la somministrazione di emoderivati deve essere:**

- A preventivamente informato, che tali procedure possono non essere completamente esenti da rischio, ed e' tenuto ad esprimere per iscritto il proprio consenso o dichiarare esplicitamente il proprio dissenso alla trasfusione.
 - B deve essere reso consapevole della durata della trasfusione
 - C deve essere adeguatamente preparato, e deve poter esprimere per scritto la propria volontà solo in caso di dissenso
 - D deve essere informato solo se la trasfusione è di sangue intero
-

22) **Quale tra le seguenti affermazioni sulla valvola tricuspidè è falsa:**

- A Permette il passaggio di sangue in una sola direzione da atrio a ventricolo
 - B Mette in comunicazione l'atrio destro con il ventricolo sinistro
 - C È costituita da tre lembi di forma irregolare
 - D È rivestita da tessuto chiamato endocardio
-

23) **Un indicatore è:**

- A grandezza nota cui si fa ricorso per avere un criterio di valutazione per altre grandezze
 - B una unità di misura per monitorare il bilancio di una azienda sanitaria
 - C una equazione capace di misurare un fenomeno e le sue variabili
 - D una misura sintetica espressa in forma quantitativa riferita ad una o più variabili, in grado di riassumere l'andamento del fenomeno cui è riferito
-

24) **Nel processo infermieristico per una persona con leucemia acuta gli obiettivi principali per l'assistito riguarderanno:**

- A Tutti gli obiettivi proposti nelle altre risposte
 - B Assenza di complicanze e di dolore
 - C Il raggiungimento e il mantenimento di un'adeguata nutrizione
 - D La tolleranza allo svolgimento delle attività
-

25) **L'assistenza infermieristica ad una persona a rischio ipervolemia prevede alcune valutazioni tra cui:**

- A La valutazione dello stato di coscienza, il bilancio delle entrate/uscite e la misurazione del PH gastrico.
 - B La VAS, il monitoraggio dei suoni respiratori e la presenza petecchie.
 - C Il bilancio delle entrate/uscite, la misurazione del peso corporeo, il monitoraggio dei suoni respiratori e la presenza di edemi.
 - D La misurazione del peso corporeo, la valutazione della glicemia e dell'uricemia.
-

26) **Sono fattori di rischio modificabili per coronaropatia:**

- A Età, sesso ed iperlipidemia congenita
 - B Storia familiare di coronaropatia, fumo ed età
 - C Sesso, diabete e storia familiare per coronaropatia
 - D Fumo, obesità, iperlipidemia
-

27) **Per afasia si intende:**

- A difficoltà alla deglutizione
 - B stato soporoso e confusione mentale
 - C Incapacità di leggere le parole scritte
 - D Incapacità di comprendere e di parlare
-

28) **Un infermiere vuole condurre uno studio sulla gestione del dolore postoperatorio. Che cosa dovrebbe fare come prima cosa?**

- A Analizzare i dati rilevati dalle cartelle cliniche
 - B Sottoporre il protocollo di studio al comitato etico
 - C Fare una ricerca bibliografica
 - D Arruolare il campione
-

29) **Quale dei seguenti termini meglio descrive la modalità per diminuire il rischio di trasmissione di microrganismi patogeni per via ematica e il confinamento dei microrganismi patogeni?**

- A Precauzioni universali.
 - B Isolamento protettivo.
 - C Asepsi medica.
 - D Precauzioni standard.
-

30) **Quali parti della sedia a rotelle sono più frequentemente contaminate da microrganismi:**

- A Seduta e schienale
 - B Braccioli e manopole per spingere
 - C Seduta e poggipiedi
 - D Schienale e ruote
-

31) **DOMANDA DI RISERVA**

Indicare l'affermazione corretta riguardo l'infermieristica transculturale:

- A Nell'infermieristica transculturale vengono uniti i valori del caring con le convinzioni dell'infermiere che cerca di imporre le proprie prospettive culturali all'assistito.
 - B L'infermieristica transculturale non tiene conto delle differenze e delle analogie culturali in gruppi eterogenei di persone.
 - C L'infermieristica transculturale è la pratica infermieristica basata sulla ricerca, centrata sulla persona e culturalmente competente.
 - D L'infermieristica transculturale tiene conto solamente delle analogie tra culture nell'ambito della definizione di malattia.
-

32) **DOMANDA DI RISERVA**

Quale delle seguenti lipoproteine è correlata a coronaropatia:

- A LDC-H
- B HDL-C
- C LDL-C
- D ATP-C