

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO NEL PROFILO DI FISIOTERAPISTA (AREA DEI
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) - PROVA
SCRITTA - BUSTA 2**


-
- 1) Il volume d'aria scambiato durante il respiro a riposo è:
- A 800 cc
 - B 300 cc
 - C 500 cc
 - D 200 cc
-
- 2) Quale parte dell'articolazione NON ha terminazioni nervose?
- A La cartilagine articolare
 - B La capsula articolare
 - C La membrana sinoviale
 - D I legamenti
-
- 3) Quale tra le seguenti dizioni NON si riferisce ad un movimento involontario:
- A Tremore
 - B Corea
 - C Spasticità
 - D Atetosi
-
- 4) Qual è il principale segno distintivo del cammino del paziente con atassia cerebellare?
- A La lunghezza del passo ridotta
 - B Lo steppage
 - C La base d'appoggio allargata
 - D La velocità ridotta
-
- 5) Quale alterazione a livello muscolare si rileva inizialmente nella Sclerosi Laterale Amiotrofica?
- A Paralisi flaccida
 - B Rigidità
 - C Tetania
 - D Fascicolazioni muscolari
-
- 6) L'ampiezza della rotazione interna dell'anca è:
- A 90°
 - B 60°
 - C 15°-20°
 - D 30°-40°
-
- 7) Quale affermazione sui nervi cranici è errata:
- A Mediano le funzioni sensitive e motorie della faccia e del capo e alcune funzioni vegetative del corpo
 - B Sono considerati parte del sistema nervoso centrale
 - C Sono considerati parte del sistema nervoso periferico
 - D I loro nuclei si trovano nel tronco encefalico
-
- 8) Per le professioni sanitarie della riabilitazione, quale norma definisce i concetti di titolarità ed autonomia professionale?

- A La Legge n. 502 del 30 Dicembre 1992
B La Legge n. 833 del 23 Dicembre 1978
C La Legge n. 24 dell'8 Marzo 2017
D La Legge n. 251 del 10 Agosto 2000

-
- 9) Nel neonato di 3-4 mesi, è possibile facilitare l'attenzione verso oggetti e persone o il reaching, attraverso:
- A L'approssimazione delle spalle
B Il controllo esterno del bacino
C Il controllo esterno di testa e tronco
D L'approssimazione delle anche
-
- 10) Un'occlusione dell'arteria cerebrale anteriore può determinare più frequentemente tutti i seguenti esiti, tranne:
- A Disturbo di funzione corticale superiore (afasia, disturbo visuospatiale)
B Emiplegia controlaterale alla lesione con debolezza prevalentemente dell'arto inferiore
C Alterazione del tono muscolare prevalentemente all'apparato flessorio dell'arto superiore
D Emianopsia controlaterale alla lesione
-
- 11) Una lesione del Nervo Radiale si caratterizza clinicamente con:
- A Mano ad artiglio
B Mano benedicente
C Mano cadente
D Mano a scimmia
-
- 12) Una lussazione traumatica anteriore di spalla è più frequentemente dovuta a:
- A Eccessivo stress in rotazione esterna e adduzione dell'omero
B Eccessivo stress in rotazione esterna e abduzione dell'omero
C Eccessivo stress in rotazione interna e adduzione dell'omero
D Eccessivo stress in rotazione interna e flessione dell'omero
-
- 13) La fascia di età maggiormente colpita dalla Sindrome del Tunnel Carpale è:
- A 40-60 anni
B 65-75 anni
C 20-40 anni
D Over 75 anni
-
- 14) L'innervazione centrale del muscolo Bicipite brachiale è:
- A C2-C3
B T1-T2
C C3-C4
D C5-C6
-
- 15) Nell'attività eccentrica:
- A La forza massima è maggiore che in quella concentrica
B La forza massima non è influenzata dalla velocità di allungamento
C La forza massima diminuisce con il diminuire della velocità di allungamento
D La forza massima è uguale a quella isometrica
-
- 16) Quale delle seguenti affermazioni sul Riflesso tonico asimmetrico cervicale è VERA?
- A Dalla posizione di quadrupedia, se si flette la testa avanti si osserva: flessione degli arti superiori ed estensione degli inferiori
B Dalla posizione di quadrupedia, se si estende la testa all'indietro si osserva: estensione degli arti superiori e flessione degli arti inferiori
C Quando il neonato si trova in posizione supina, se si ruota la testa da un lato si osserva: estensione dell'arto superiore omolaterale e flessione del controlaterale
D Quando il neonato si trova in posizione supina, se si ruota la testa da un lato si osserva: flessione dell'arto superiore omolaterale e estensione del controlaterale

-
- 17) **Il Fisioterapista può fornire informazioni su un paziente degente in un reparto per acuti:**
- A Solo al coniuge/convivente
 - B Solo alle forze dell'ordine
 - C Solo a terzi legittimati
 - D A nessuno
-
- 18) **Per ICF (International Classification of Functioning) si intende:**
- A La classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute
 - B La classificazione statistica internazionale della salute e della prognosi funzionale
 - C La classificazione internazionale del funzionamento, della malattia e della prognosi
 - D La classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi correlati
-
- 19) **L'ELTGOL è:**
- A Una tecnica di distruzione bronchiale
 - B Un test per valutare la massima pressione espiratoria
 - C Una tecnica di rieducazione della meccanica respiratoria
 - D Un'interfaccia per la ventiloterapia non invasiva
-
- 20) **Quali tra i seguenti muscoli conserva una normale capacità di contrazione nel caso di una lesione midollare completa L4-L5?**
- A Muscolo Gastrocnemio
 - B Muscolo Grande Gluteo
 - C Muscolo Ileo-psoas
 - D Muscolo Tibiale anteriore
-
- 21) **Quali fra i seguenti muscoli fissano il bacino durante il movimento di estensione dell'anca:**
- A I glutei
 - B Gli erector spinae
 - C Gli ischiocrurali
 - D Gli addominali obliqui
-
- 22) **La sensibilità di un test diagnostico:**
- A E' sempre uguale all'accuratezza globale
 - B E' la probabilità condizionata di avere un test negativo, data l'assenza di malattia
 - C Non è una caratteristica di un test diagnostico
 - D E' la probabilità condizionata di avere un test positivo, data la malattia
-
- 23) **Una revisione sistematica con metanalisi è:**
- A Una revisione sistematica che include esclusivamente studi di tipo osservazionale
 - B Una revisione della letteratura scientifica che raccoglie, secondo criteri di inclusione predefiniti, studi riguardo uno specifico quesito di ricerca, integrando statisticamente i risultati degli studi inclusi
 - C La sintesi statistica di un trial clinico randomizzato
 - D Una combinazione tra una ricerca di tipo secondario e uno studio di intervento
-
- 24) **Il disturbo afasico nel paziente con esiti di ictus si manifesta come:**
- A Un deficit del linguaggio, sia nell'espressione che nella comprensione
 - B Un deficit di sensibilità multimodale
 - C Un disturbo dell'apparato fonatorio
 - D Un deficit percettivo
-
- 25) **Quale/quali tra i seguenti muscoli è/sono innervato/i dal Nervo tibiale?**

- A Tibiale anteriore
- B Tricipite surale e Tibiale posteriore
- C Tricipite surale e Tibiale anteriore
- D E' un nervo esclusivamente di tipo sensitivo



-
- 26) Per prevenire l'edema del moncone nel paziente affetto da amputazione transtibiale NON è indicato:
- A Posizionare un cuscino sotto l'ischio omolaterale all'intervento durante il mantenimento della posizione supina
 - B Mantenere l'arto in elevazione
 - C Applicare bendaggi compressivi al moncone
 - D Dotare la carrozzina di un supporto per il moncone
-
- 27) Un muscolo che si contrae automaticamente e contemporaneamente alla contrazione di un altro muscolo per prevenire un'azione indesiderata è detto:
- A Sinergico
 - B Complementare
 - C Antagonista
 - D Agonista
-
- 28) Nella riabilitazione uro-ginecologica, il bio feedback:
- A E' esclusivamente una tecnica di elettro-stimolazione passiva che integra segnali di tipo propriocettivo
 - B E' una tecnica di esclusiva pertinenza specialistica
 - C E' uno strumento di diagnostica per immagini che richiede supervisione medica
 - D E' una tecnica di rieducazione motoria attiva integrata con l'utilizzo di un dispositivo elettronico che fornisce al paziente informazioni di ritorno visive e/o uditive
-
- 29) Il momento di una forza o torque:
- A Aumenta con l'aumentare del braccio della leva
 - B Aumenta con il ridursi della forza applicata
 - C E' inversamente proporzionale al modulo della forza applicata
 - D Diminuisce con l'aumentare del braccio della leva
-
- 30) Quale affermazione sulla cadenza del passo nel cammino normale è FALSA:
- A La cadenza è generalmente più bassa nelle donne e nei bambini
 - B La cadenza è inversamente proporzionale alla lunghezza dell'arto inferiore
 - C La cadenza è direttamente proporzionale alla velocità di marcia
 - D Nella Gait Analysis, insieme a velocità e lunghezza dello stride, fa parte dei parametri spazio-temporali